

Scheda misure pratiche | Insetti


# Zone e misure per la lotta al coleottero giapponese (*Popillia japonica*)



Chiunque sospetti la presenza di adulti o larve di *Popillia japonica* sul territorio cantonale deve notificarlo al Servizio fitosanitario cantonale: [servizio.fitosanitario@ti.ch](mailto:servizio.fitosanitario@ti.ch) tel. 091 814 35 85 / 87



## Zona indenne



Cinque ciuffi pelosi bianchi su ogni lato

Due ciuffi pelosi bianchi più grandi nella parte posteriore



## Zona cuscinetto

Alto Malcantone, Aranno, Arogno, Ascona, Avegno Gordevio, Bellinzona (sezioni di Bellinzona, Camorino, Giubiasco, Gudo, Monte Carasso, Pianezzo, Sant'Antonio, Sementina), Breggia (sezioni di Bruzella, Cabbio, Muggio), Brione s/Minusio, Cadenazzo, Capriasca, Centovalli, Cugnasco Gerra, Gambarogno (sezioni di Contone, Gerra, Indemini, Magadino, Piazzogna, San Nazzaro, Sant'Abbondio, Vira), Gordola, Isone, Lavertezzo, Locarno, Losone, Lugano (sezioni di Bogno, Cadro, Certara, Cimadara, Davesco Soragno, Sonvico, Valcolla, Villa Luganese), Maggia, Mergoscia, Mezzovico-Vira, Miglioglia, Minusio, Monteceneri, Muralto, Onsernone, Orselina, Ponte Capriasca, Ronco s/Ascona, Sant'Antonino, Tenero-Contra, Terre di Pedemonte, Verzasca (sezioni di Brione, Corippo, Lavertezzo, Vogorno).

## Zona infestata

Agno, Astano, Balerna, Bedano, Bedigliora, Bioggio, Bissone, Breggia (sezioni di Caneggio, Morbio Superiore, Sagno), Brissago, Brusino Arsizio, Cademario, Cadempino, Canobbio, Caslano, Castel San Pietro, Chiasso, Coldrerio, Collina d'Oro, Comano, Cureglia, Curio, Gambarogno (sezione di Caviano), Grancia, Gravesano, Lamone, Lugano (sezioni di Barbengo, Brè, Breganzona, Carabbia, Carona, Castagnola, Cureglia, Gandria, Lugano, Pambio Noranco, Pazzallo, Pregassona, Viganello), Magliaso, Manno, Massagno, Melide, Mendrisio, Morbio Inferiore, Morcote, Muzzano, Neggio, Novaggio, Novazzano, Origlio, Paradiso, Porza, Pura, Riva San Vitale, Savosa, Sorengo, Stabio, Torricella-Taverne, Tresa, Vacallo, Val Mara, Vernate, Vezia, Vico Morcote.



## ● Zona infestata e ● Zona cuscinetto

### MATERIALE VEGETALE

Dal 1° giugno al 30 settembre è vietato trasportare materiale:

- al di fuori della zona infestata;
- dalla zona cuscinetto alla zona indenne;

a meno che non sia stato tritato a una dimensione massima di 5 cm o sottoposto a un trattamento che offra sicurezza fitosanitaria comparabile e riconosciuto dal Servizio fitosanitario federale (SFF).

Il materiale vegetale trattato resta coperto fino al giorno del trasporto e è trasportato coperto con un telo (dimensione massima maglie 5 mm).

### COMPOSTAGGIO

A meno che non sia proveniente da impianti dotati di box di fermentazione a temperatura controllata e setacciato, è vietato il suo trasporto:

- al di fuori della zona infestata;
- dalla zona cuscinetto alla zona indenne.

### TERRA DI SCAVO

- È vietato trasportare i primi 30 cm di suolo scavati dai cantieri:

- al di fuori della zona infestata;
- dalla zona cuscinetto alla zona indenne.

Per il periodo dal 1° ottobre al 31 maggio sono possibili delle autorizzazioni al trasporto dopo analisi del suolo da richiedere al Servizio fitosanitario cantonale (SFC) oppure alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (trasporto in discarica e interrimento a 2 m di profondità).

- I veicoli e gli attrezzi impiegati per la lavorazione del suolo devono obbligatoriamente essere ripuliti dai resti di terriccio e di vegetali se:
  - lasciano la zona infestata;
  - si dirigono dalla zona cuscinetto verso la zona indenne.

### PIANTE

- Divieto di movimentazione di piante con radici in terra o in substrato organico (compreso il tappeto erboso precoltivato):
  - al di fuori della zona infestata;
  - dalla zona cuscinetto alla zona indenne.
- III divieto non si applica alle aziende che dal 1° giugno al 30 settembre mettono in atto le misure previste all'allegato 3 della Decisione generale per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel Canton Ticino, in particolare se:
  - a. la produzione e lo stoccaggio dei vegetali avvengono in un'infrastruttura a prova di insetto.
  - b. le radici vengono lavate e il substrato di coltivazione viene rimosso.
  - c. le superfici attorno alle piante sono protette con coperture a prova d'insetto e sono privi di malerbe.
- Dal 1° giugno al 30 settembre le aziende che utilizzano vegetali sono tenute a sorvegliare le parcelle di produzione, gli stock di vegetali e le aree circostanti nel raggio di 50 m. Se osservano un individuo di *Popillia japonica* devono tempestivamente segnalarlo al SFC.